ООО «РАБОС Интл.»
142784, Московская область, Ленинский район,
г. Московский, административное здание
Тел. +7 (495) 785-71-21, факс +7 (495) 785-71-25
www.RABOS.ru

ИНСЕКТИЦИДНОЕ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

ЛАРВИИЦИДНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЛИЧИНОК МУХ И ДРУГИХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ

ЛАРВА КЛИН

ЛАРВА КЛИН, действующим веществом которого является Циромазин, представляет собой ингибитор роста личинок мух и других насекомых, что дает возможность контролировать численность их популяций. Средство попадает в организм личинки вместе с кормом и тормозит развитие кутикулы, вследствие чего прекращается рост личинок, развивающихся во влажной среде (в навозе, в помете и т.п.), и наступает их гибель.



Привыкания к препарату не наблюдалось в течение 20 лет его присутствия на рынке Европы!
Действие препарата эффективно исключительно во влажной среде, поэтому, использование средства в виде порошка недопустимо.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ***Метод Полива***

Растворить 10 гр. средства в 10 л воды в расчёте на каждые 10 м^2 площади. Рабочим раствором равномерно поливают поверхность обрабатываемой площади.

- ***Метод Распыления***

Растворить 10 гр. средства в 1-4 л воды в расчёте на каждые 10 м^2 площади и распылить рабочий раствор равномерно на обрабатываемую поверхность.

Препарат применяется в присутствии животных. Поскольку личинки мух развиваются только в поверхностных слоях, не глубже чем 10 см, достаточно обработать поверхность навоза, жижи или помета. Кроме того, ЛАРВА КЛИН обрабатывается решетчатый пол, области помещения вдоль стен (мин. 50 см от стены) и другие места, где могут накапливаться остатки корма или другие виды грязи.
При обработке обратить особое внимание на наиболее проблемные участки – вблизи трубопроводов, углов помещений, плинтусов и т.п.

Рекомендуется обработать навоз, находящийся в навозохранилищах снаружи.

Повторное и следующее применение необходимо проводить через 4-х недель. В зависимости от степени инвазии можно и чаще проводить обработку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

По лимитирующим показателям токсичности для инсектицидных средств – по зоне острого и подострого биоцидного эффекта – средство относится к 4 классу мало опасных по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

Препарат токсичен для водных организмов.

Условия хранения и транспортировки: Средство хранят в плотно закупоренных контейнерах в сухих прохладных складских помещениях, вне доступа прямых солнечных лучей и открытого огня, отдельно от кормов, пищевых продуктов, фуража, лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.
Температурный режим транспортирования и хранения средства от -10°С до +30° С.
Допускается транспортирование всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующих на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность тары и средства.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В животноводстве применение средства в качестве превентивной меры необходимо спустя 2 дня после очищения пустого помещения или перед аэрозольной дезинфекцией.
В свиноводческих хозяйствах обработка рекомендуется непосредственно перед введением животных в помещение или при первых признаках появления летающих насекомых.
В птицеводстве эффективность действия препарата повышается в случае его использования спустя неделю после уборки всего помета, если вновь образовавшийся слой не превышает 10 см.
Поскольку популяция мух состоит только на 15% из взрослых особей, а на 85% – из личинок на разных стадиях развития, успешное решение проблем с мухами в животноводстве и птицеводстве требует одновременного применения средств против взрослых особей («адултицидов» - ФЛАЙ КЛИН или МОСКИНА) и личиночных стадий мух («ларвицидов» – «ЛАРВА КЛИН»).

СОСТАВ:

Циромазин - 50%
Вспомогательные компоненты до 100%

ВНЕШНЫЙ ВИД

Белый порошок

УПАКОВКА: 500 гр

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года

По всем вопросам приобретения и применения инсектицидного препарата “ЛАРВА КЛИН ” обращайтесь к техническим специалистам компании РАБОС Интл.